© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

The Journal of Conchology. Vol. V. No. 12.

p. 353. *Collier, Edward,* Land and Freshwater Mollusca of Cardiganshire.

p. 356. *Cockerell, Sydney C.*, Conchological Notes from Picardy. Faunistische Angaben aus der Gegend von Amiens und Abbeville.

p. 358. *Cockerell, T. D. A.*, on Agriolimax montanus in Colorado. Der Autor hält sowohl montanus als occidentalis nur für Localformen des Limax campestris Say. In Colorado kommt nur montanus vor, aber in drei Varietäten, welche C. als typicus, intermedius und tristis unterscheidet; die beiden letzteren Formen gehören höheren Lagen an.

p. 361. *Marshall, J. T.*, Argiope decollata at Scilly.

p. 364. *Williams, J. W.*, on the Morphology of the Gonads in Limnaea stagnalis and L. peregra.

Kleinere Mittheilungen.

Die nachgelassene Sammlung des Majors G. B. Adami ist nach einer Mittheilung im Naturalista Siciliano in den Besitz des Marchese Allery di Monterosato übergegangen.

In Bezug auf **Harnleiter und Niere der Pulmonaten** kann nach den nun beendeten Untersuchungen von Dr. Th. Behme noch mitgetheilt werden, dass ebenso wie Buliminus pupa Brug. (vergl. Nachrichtsblatt No. 9/10 1888) sich noch Bul. obscurus Müll., Hel. radiatus Brug., Cionella lubrica Müll., Pupa avenacea Brug. und Helix pulchella Müll. verhält; bei allen genannten Arten erinnert die Niere und Harnleiter sehr an die entsprechenden Organe bei Limnaeen d. h. die Niere selbst verlängert sich direkt in einen gerade von hinten nach vorn gehenden Harnleiter, der nicht unmittelbar neben dem Mastdarm verläuft und kurz hinter dem Athemloch ausmündet; es fehlt also hier nach unserer Anschauungsweise der sekundäre, aus der Lungenhöhle hervorgegangene Harnleiter. Ebenso liegen die Verhältnisse nach den Abbildungen von Lacaze Duthiers bei Testacella, während Daudebardia, Vitrina, Hyalina, Zonites, Leucochroa, Patula wie fast alle Helix-Arten, ferner Clausilia und ein Theil der Bulimini einen sekundären Harnleiter haben — so weit dieselben bisher untersucht werden konnten; unter den Wasserlungenschnecken sind Ausnahmen nicht beobachtet worden.

M. Braun.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

(Stenogyra octona auf Neucaledonien). Nach einer Mittheilung von E. L. Layard, gegenwärtig Viceconsul in Noumea, ist die westindische *Stenogyra octona* auf einmal massenhaft auf der Ostküste von Neucaledonien aufgetreten und zwar auf einer Kaffeeplantage bei Kanala. Das Pflanzenmaterial der Plantage war nicht aus Westindien, sondern aus Bourbon bezogen worden.

Mittheilungen und Anfragen.

Der Unterzeichnete beabsichtigt die eingehende Bearbeitung der südamerikanischen Süsswasserbivalven, speciell der brasilianischen und argentinischen Formen, und bittet die Besitzer von Material von sicherem Fundort um Mittheilung. Sendungen sind bis Ostern nach Göttingen zu richten.

Dr. H. von Ihering.

Neue Mitglieder.

Herr *Karl Wohlgemuth* in Bozen, Laubengasse 62.

Herr *Cam. Schaufuss*, Direktor des Museums in Meißen.

Eingegangene Zahlungen.

Simon, S. 6.—; Seibert, E. 6.—; Salm-Salm, A. 6.—; Clessin, O. 6.—; Riemenschneider, N. 6.—; Goldfuss, H. 6.—; Eyrich, M. 6.—; Bachmann, L. 6.—; Bohrmann, B. 6.—; Hesse, V. 6.—; Merkel, B. 6.—; Miller, St. 6.—; Gysser, K. 6.—; Puppe, W. 6.—; v. Monsterberg B. 6.—; Friedel, B. 6.—; Dalla-Torre, J. 6.—; Hofer, M. 6.—; Löbbecke, D. 6.—; Fietz, S. 6.—; Gloyne, B. 6.—; Kreglinger, K. 6.—; Tschapeck, W. 6.—; Zoolog. Museum, Berlin 12.—; Arndt, B. 6.—; Westerlund, R. 12.—; v. Martens, B. 6.—; Ankarcrona, C. 6.—; Naturf. Gesellschaft, Görlitz 6.—; Kretzer, M. 6.—; Ponsonby, L. 6.—; Kunze, Th. 6.—; Nägele, W. 6.—; Michael, W. 6.—; Ressmann, M. 6.—.

Anzeige.

Antiquar. Bulletin No. 43

Mollusca fossilia et viventia

erschien soeben und wird gratis und franco versandt.

H. Loescher's Antiquariat (Carl Clausen) in Turin.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.